

Checkliste Ohrkorrektur (Otoplastik)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben sich für eine operative Korrektur Ihrer abstehenden Ohren entschieden. Es entsteht eine Narbe hinter dem Ohr, die praktisch unsichtbar bleibt. Die Korrektur wird in örtlicher Betäubung und ambulant in der Ordination durchgeführt.

Die genaue Kostenaufstellung erhalten Sie beim Erstberatungsgespräch.

Ich bitte Sie, nachfolgende Hinweise zu beachten. Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Dr. Rene Draxler

Vor der Behandlung

- Nach Möglichkeit bereits 10 Tage vor der Operation keine blutverdünnenden Medikamente (z. B. Aspirin) einnehmen
- Besorgen Sie sich bitte ein Stirnband welches straff, jedoch nicht zu fest am Kopf anliegt. Breite des Stirnbandes in etwa 7-10 cm
- Vor Beginn der OP wird der Ablauf nochmals im Detail besprochen. Zur Dokumentation werden Fotos angefertigt
- Falls Sie es wünschen verabreiche ich Ihnen gerne ein Beruhigungsmittel
- Wir empfehlen Ihnen, sich nach der OP abholen zu lassen

Während der Behandlung

- Die OP dauert in etwa 1 Stunde
- Sie verspüren nur ein leichtes Brennen während der Betäubung
- Die Naht hinter dem Ohr wird mit einem Streifenpflaster (Steristrip) versorgt
- Für 1 Nacht wird Ihnen eine Kopfverband angelegt

Nach der Behandlung

- Ein leichter Wundschmerz kann auftreten und ist normal, starke Schmerzen werden Sie aber keine haben.
- Ruhe in den ersten 2 Tagen wird empfohlen. Keine Anstrengungen!
- Am 1. Tag nach der OP erfolgt die Kontrolle und der Kopfverband wird abgenommen um einen Bluterguss ausschließen zu können. Ab diesem Tag ist das Stirnband für 1 Woche Tag und Nacht zu tragen, danach für weitere 2 Wochen nur nachts.
- Nach wenigen Tagen erfolgt bei einer weiteren Kontrolle der Wechsel des Streifenpflasters. Danach ist die gewohnte Gesichts- und Haarpflege wieder möglich
- Nach 14 Tagen wird das Streifenpflaster hinter dem Ohr entfernt. Nachdem die Naht resorbierbar ist die Entfernung nicht notwendig
- Üblicherweise sind Sie nach 1 Woche wieder gesellschaftsfähig. Für etwa 2-3 Wochen kann die Ohrmuschel noch leichte farbliche Veränderung aufweisen (rötliche oder bläuliche Verfärbung)
- Vermeiden Sie f
 ür 2-3 Wochen Hitze (Sauna)und sportliche Aktivit
 äten
- Die Beurteilung des OP- Erfolges ist erst nach einem Monat möglich