

Checkliste

Korrektur bei Schlupfwarzen

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben sich für eine Korrektur der eingezogenen Brustwarzen (Schlupfwarzen) entschieden. Diese Korrektur kann bestens in örtlicher Betäubung vorgenommen werden. Es entsteht lediglich eine praktisch unsichtbare Narbe am unteren Rand der Brustwarze. Die OP wird in örtlicher Betäubung ambulant in der Ordination durchgeführt.

Ich bitte Sie, nachfolgende Hinweise zu beachten.
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!

Dr. René Draxler

Vor der Behandlung

- Nach Möglichkeit bereits 10 Tage vor der OP keine blutverdünnenden Medikamente (z. B. Aspirin) einnehmen
- Bringen Sie bitte einen gut sitzenden Sport-BH zur OP mit.
- Vor Beginn der OP wird der Ablauf nochmals im Detail besprochen. Zur Dokumentation werden Fotos angefertigt
- Sollten Sie beunruhigt sein verabreiche ich Ihnen gerne ein Beruhigungsmittel
- Vor der OP wird die OP- Region von uns mit einer anästhetischen Salbe versorgt um eine Vorbetäubung zu erreichen

Während der Behandlung

- Die OP dauert in etwa 30 Minuten
- Sie verspüren ein leichtes Brennen während der Betäubung
- Die Naht wird mit Streifenpflaster (Steristrip) versorgt. Dazu erhalten Sie einen Spezialverband rund um die Mamilla und ein Duschpflaster

Nach der Behandlung

- Nach Abklingen der Betäubung ist ein leichter Wundschmerz normal. Starke Schmerzen sind nicht zu erwarten
- Für die ersten 2 Tage nach der OP sollten Sie auf Ruhe achten und keine anstrengenden Tätigkeiten durchführen
- Duschen ist erlaubt
- Nach einigen Tagen erfolgt die Kontrolle und die Nahtentfernung
- Der Spezial-BH sollte 2 Wochen Tag und Nacht getragen werden
- Vermeiden Sie Hitze (Sauna, Sonne) und sportliche Aktivitäten in den nächsten 2 – 3 Wochen